Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF

Agroscope

Nitratauswaschung unter Gemüse: Literaturstudie und Lysimeterversuch

Ernst Spiess, Clay Humphrys, Frank Liebisch,
Oliver Zemek, Reto Neuweiler

26. April 2022

Literaturstudie: Ergebnisse

- viele publizierte Messergebnisse zur Nitratauswaschung im Gemüsebau
- Die Bedingungen in diesen Studien waren aber sehr unterschiedlich bezüglich Boden, Klima, Kultur(folge), Bewirtschaftung, Messmethoden und häufig nicht mit den Verhältnissen in der Schweiz vergleichbar.
- Daher können keine Standardwerte daraus abgeleitet werden.

Bewertungssystem für Auswaschungspotenzial

- Literaturdaten zu drei Parametern
 - N-Bedarf der Pflanzen,
 - N-Menge in den Ernterückständen
 - Wurzeltiefe
 wurden für 40 Gemüsearten zusammengestellt und klassifiziert.

Gemüseart	N-Sollwert	N-Menge in Ernterückständen	Wurzeltiefe	Gesamtpunktzahl	Potenzial
Blumenkohl	4	4	3	11	hoch
Brokkoli	4	4	3	11	
Rosenkohl	4	4	3	11	
Lauch	3	3	4	10	
Wirz	4	4	2	10	
Zucchetti	3	4	2	9	mittel
Zuckermais	2	3	4	9	
Kabis	4	4	1	9	
Sellerie, Stangen-	3	2	4	9	
Bohnen	2	3	3	8	
Chinakohl	3	3	2	8	
Erbsen	2	3	3	8	
Federkohl	4	2	2	8	
Kohlrabi	3	2	3	8	
Schnittlauch	3	1	4	8	
Sellerie, Knollen-	3	2	3	8	gering
Randen	3	3	1	7	
Zwiebeln	1	2	4	7	
Karotten	2	2	3	7	
Salate (<i>Lactuca sativa</i>)	2	1	4	7	
Fenchel	2	2	2	6	
Kürbis, Speise-	2	2	2	6	
Pastinake	2	2	2	6	
Nüsslisalat	1	1	4	6	
Rüben	2	1	3	6	
Salate (<i>Cichorium</i>)	2	1	3	6	
Schwarzwurzel	2	1	2	5	
Spinat	1	1	3	5	
Krautstiel	2	1	2	5	
Petersilie	1	1	3	5	
Radieschen	1	1	3	5	
Rettich	2	1	2	5	
Rucola	2	1	2	5

Weiter entwickeltes Bewertungssystem

Kulturfolge im Jahr			1) N-Düngungsbedarf (kg N/ha)				2) N-Menge in Ernterückständen (kg N/ha)				3) korrigierte effektive Wurzeltiefe (cm)				Punktzahlen				
Kultur 1	Kultur 2	Kultur 3	Ku.1	Ku.2	Ku.3	Total	Ku.1	Ku.2	Ku.3	Total	Ku.1	Ku.2	Ku.3	Total	1) N-Dü.	2) N-Me.	3) Tiefe	4) ZK	Total
Cicorino rosso	Frisée	Gründüngung	110	130	30	270	40	60	85	185	9	6	12	26	0.5	0.6	0.4	-0.5	1.0
Frisée	Cicorino rosso	Gründüngung	130	110	30	270	60	40	85	185	6	9	12	26	0.5	0.6	0.4	-0.5	1.0
Weisskohl, Lager-	Gründüngung		190	30		220	150	85		235	14	12		26	0.4	0.8	0.4	-0.5	1.1
Salate, div.	Frisée	Gründüngung	110	130	30	270	50	60	85	195	2	6	12	20	0.5	0.7	0.5	-0.5	1.2
Endivien	Salate, div.	Gründüngung	160	110	30	300	100	50	85	235	8	2	12	22	0.6	0.8	0.5	-0.5	1.4
Salate, div.	Endivien	Gründüngung	110	160	30	300	50	100	85	235	2	8	12	22	0.6	0.8	0.5	-0.5	1.4
Salate, div.	Zucchetti		110	130		240	50	100		150	2	18		20	0.5	0.5	0.5	0	1.5
Weisskohl, Lager-			190			190	150			150	14			14	0.4	0.5	0.6	0	1.5
Fenchel, Knollen-	Chinakohl		160	160		320	100	80		180	10	7		18	0.6	0.6	0.6	0	1.8
Weisskohl, Lager-	Zuckerhut		190	130		320	150	60		210	14	9		22	0.6	0.7	0.5	0	1.8
Chinakohl	Lauch		160	200		360	80	100		180	7	9		16	0.7	0.6	0.6	0	1.9
Endivien	Broccoli		160	220		380	100	150		250	8	7		15	0.8	0.8	0.6	0	2.2
Salate, div.	Blumenkohl		110	260		370	50	200		250	2	8		11	0.7	0.8	0.7	0	2.3
Blumenkohl	Salate, div.	Nüsslisalat	260	110	50	420	200	50	0	250	8	2	2	12	0.8	0.8	0.7	0	2.4
Broccoli	Salate, div.	Salate, div.	220	110	110	440	150	50	50	250	7	2	2	12	0.9	0.8	0.7	0	2.4
Broccoli	Broccoli		220	220		440	150	150		300	7	7		14	0.9	1.0	0.6	0	2.5

- gibt Hinweise für das Auswaschungspotenzial
- nicht für den Vollzug im Gäu geeignet (z.B. im Nitratindex)

Massnahmen zur Reduktion der Auswaschung

- **Düngung:**
verbesserte Ermittlung des N-Bedarfs ($N_{\min}$ -Methode);
bessere Berücksichtigung der organischen Dünger und Ernterückstände (Nachwirkung des organ. N);
Überarbeitung der GRUD-Normen
- **Fruchtfolgen** optimieren (z.B. Zwischenkulturen)
- besserer Umgang mit **Ernterückständen**
- Steuerung der **Bewässerung**
(z.B. klimatischen Wasserbilanz,
Bodenfeuchtesensoren wie Tensiometer, FDR)

Lysimeterversuch

12 Lysimeter (3 m²; 2,5 m tief)

Fruchtfolge:

Jahr 1: Broccoli + Salat 1 + 2

Jahr 2: Chinakohl + Lauch

Jahr 3: Kabis + Zuckerhut

bracher Boden über Winter

Zwei Formen des Umgangs mit den Ernterückständen werden miteinander verglichen:

a) **Einarbeitung** der Ernterückstände

b) **Abfuhr** der oberirdischen Ernterückstände

Nitratauswaschung

Schotterboden

Moräneboden

Gesamtmittel:

Abfuhr Einarbeiten

Abfuhr Einarbeiten

Abfuhr Einarbeiten Differenz

Sickerwassermenge (mm):

2017/18	489	491	450	443
2018/19	469	479	478	462
2019/20	582	593	605	571

512 = 507 1%

Nitratkonzentration (mg NO₃⁻ L⁻¹):

2017/18	99	132	116	85
2018/19	56	71	43	56
2019/20	77	108	200	236

102 < 119 -14%

Ausgewaschene N-Fracht (kg N ha⁻¹):

2017/18	109	146	118	85
2018/19	60	77	46	58
2019/20	101	144	273	305

118 < 136 -13%

Diff. 18 kg N ha⁻¹

Nitratkonzentration während des Versuchs

Düngung-Wegfuhr-Bilanz (kg N ha⁻¹)

	N-Bilanz						N in Ernte- rückst.
	Rückstände abgeführt			Rückstände belassen			
	Düngung	Wegfuhr	Bilanz	Düngung	Wegfuhr	Bilanz	
Broccoli	250	230	20	245	71	174	156
Kopfsalat 1	120	96	24	90	74	16	28
Kopfsalat 2	120	65	55	110	48	62	19
1. Jahr	490	390	100	445	193	252	203
Chinakohl	180	268	-88	175	125	50	135
Lauch	220	226	-6	200	178	22	73
2. Jahr	400	495	-95	375	302	73	208
Weisskabis	220	217	3	200	130	70	80
Zuckerhut	140	226	-86	110	145	-35	95
3. Jahr	360	443	-83	310	275	35	175
Mittel	417	443	-26	377	257	120	195

Diff. 146 kg N ha⁻¹

Einfluss der Abfuhr der Ernterückstände 1

kein:

Ertrag (Marktware + Ernterückstände)

Sickerwassermenge

mittel:

Nitratkonzentration - 14%

Nitratauswaschung - 18 kg N ha⁻¹

gross:

N-Bilanz - 146 kg N ha⁻¹

Was passiert mit der Differenz von 128 kg N ha⁻¹?

Humuszunahme, Ammoniakverluste, Denitrifikation?

→ steigende Erträge und/oder Nitratauswaschung
in Zukunft?

Einfluss der Abfuhr der Ernterückstände 2

Die Abfuhr der Ernterückstände reduziert die Nitratauswaschung

aber:

- erhöht den Arbeitsaufwand und die Produktionskosten
- Was passiert mit den abgeführten Ernterückständen?
Kompost, Biogasgasproduktion, andere Lösungen?
- Humusbilanz des Bodens:
Müssen wir die abgeführten Ernterückstände mit anderer organischer Substanz ersetzen?
Welchen Einfluss hat die Kompostausbringung auf die Nitratverluste?

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Ernst Spiess, Clay Humphrys, Frank Liebisch,
Oliver Zemek & Reto Neuweiler

Agroscope gutes Essen, gesunde Umwelt
www.agroscope.admin.ch